

一、 氟派瑞

400 G/L (40% W/V) 氟派瑞 SC

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明
瓜菜類 瓜果類	根瘤 線蟲	0.01-0.4 公升	3,000	於植株定植後澆灌藥液1次，每株澆灌40毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌50-1,000公升藥液。					1. 施用前請保持土壤濕潤。 2. 胡瓜、美濃瓜嫩葉接觸到較高劑量氟派瑞時，會引起葉緣發生黃白化藥斑之現象。	延伸使用

整併現行胡瓜根瘤線蟲之使用方法與範圍。

500 G/L (50% W/V) 氟派瑞 SC

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明
瓜菜類 瓜果類	根瘤 線蟲	0.01-0.3 公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液1次，每株澆灌40毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌50-1,000公升藥液。					1. 施用前請保持土壤濕潤。 2. 胡瓜、美濃瓜嫩葉接觸到較高劑量氟派瑞時，會引起葉緣發生黃白化藥斑之現象。	延伸使用

整併現行胡瓜根瘤線蟲之使用方法與範圍。

二、 達特南  
20.000 %達特南 SG

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明
大豆 花豆 豇豆 樹豆 綠豆	蚜蟲類	0.3-0.4 公斤	2,000	害蟲發生時 開始施藥	7			21	適用於乾豆	延伸使用
蔥科根菜類 蔥科小葉菜類	蚜蟲類	0.4-1公 斤	2,000	害蟲發生時 開始施藥	7			7		延伸使用
甘藷	粉蝨類 蚜蟲類	0.1-0.8 公斤	2,000	害蟲發生時 開始施藥	7			6		延伸使用
芫荽	蚜蟲類	0.1-1.5 公斤	2,000	害蟲發生時 開始施藥	7			7		延伸使用
胡蘿蔔	蚜蟲類	0.1-1.5 公斤	2,000	害蟲發生時 開始施藥	7			6		延伸使用
當歸	蚜蟲類	0.1-1.5 公斤	2,000	害蟲發生時 開始施藥	7			15		延伸使用
枸杞	蚜蟲類	0.3-0.8 公斤	2,000	害蟲發生時 開始施藥	7			7	適用於枸杞葉	延伸使用
茄科果菜類	蚜蟲類	0.3-0.8 公斤	2,000	害蟲發生時 開始施藥	7			3		延伸使用
馬鈴薯	蚜蟲類	0.3-0.8 公斤	2,000	害蟲發生時 開始施藥	7			6		延伸使用
向日葵	蚜蟲類	0.1-0.5 公斤	2,000	害蟲發生時 開始施藥	7			21		延伸使用
風茹 艾草	蚜蟲類	0.1-0.5 公斤	2,000	害蟲發生時 開始施藥	7			15		延伸使用
紫蘇	蚜蟲類	0.1-0.4 公斤	2,000	害蟲發生時 開始施藥	7			7		延伸使用
仙草 薄荷 丹參	蚜蟲類	0.1-0.4 公斤	2,000	害蟲發生時 開始施藥	7			15		延伸使用
秋葵	蚜蟲類	0.2-1公 斤	2,000	害蟲發生時 開始施藥	7			3		延伸使用
胡麻	蚜蟲類	0.3-0.6 公斤	2,000	害蟲發生時 開始施藥	7			21		延伸使用

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明
草莓	蚜蟲類	0.4-1 公斤	2,000	害蟲發生時開始施藥	7			3		延伸使用
百香果	薊馬類	0.3-0.5 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥	7			10		延伸使用
檬果	薊馬類	0.3-0.7 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥	7			6		延伸使用
番荔枝	薊馬類	0.2-0.5 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥	7			15		延伸使用
木瓜	薊馬類	0.2-0.7 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥	7			10		延伸使用
酪梨	薊馬類	0.3-0.7 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥	7			10		延伸使用
紅龍果	薊馬類	0.3-0.5 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥	7			10		延伸使用
柑桔類	薊馬類	0.3-0.8 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥	7			14		延伸使用
油茶	薊馬類	0.3-1 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥	7			15		延伸使用
山茶	薊馬類	0.3-1 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥	7			15		延伸使用
茶	薊馬類	0.3-1 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥	7			15	適用於茶葉	延伸使用
茶	薊馬類	0.3-1 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥	7			15	適用於茶籽	延伸使用